

MoviGo® Duo

Drikkeklar oppløsning i doseposer

MEDISINSK UTSTYR

For effektiv og skånsom behandling og lindring av forstoppelse, forbundet med luft i magen og oppblåsthet.

1. Hva produktet er, og hva det brukes til

MoviGo Duo er et medisinsk utstyr som er utviklet for å lindre forstoppelse eller hard avføring når dette er forbundet med luft i magen og oppblåsthet.

MoviGo Duo inneholder makrogol 4000 for behandling av forstoppelse og simetikon for å lindre oppblåsthet.

Makrogol 4000, gjør avføringen myk ved å trekke vann inn i tarmen. Dette bidrar til å holde avføringen hydrert og lettere å få ut. Det gjør avføringen mer behagelig og regelmessig, uten at gi en plutselig eller akutt trang til å gå på toalettet. Makrogol 4000 tas ikke opp i kroppen. Det passerer gjennom fordøyelsessystemet og skilles ut sammen med avføringen.

Simetikon bryter ned gassbobler i tarmen og bidrar til å fjerne tarmgassen som kan oppstå ved forstoppelse.

1.1 Sammensetning

Hver dosepose inneholder:

10 g makrogol 4000, 100 mg simetikon

Hjelpestoffer: Vann, sukralose, appelsinsmak, vegetabilsk glyserin, polysorbat 80, sukroseestere, kaliumsorbat.

2. Dosering og behandlingsvarighet

Den anbefalte dosen er:

- Barn fra 1 til 6 år: 1 dosepose daglig.
- Voksne og barn fra 6 år: 2 doseposer daglig.

Drick produktet direkte fra doseposen, eller fortynn det med vann om nødvendig. Det anbefales å ta produktet mellom måltidene.

Det er ikke nødvendig å justere doseringen hos pasienter med nedsatt nyrefunksjon.

Behandlingsvarigheten er vanligvis 2 uker. Gjentatt eller langvarig behandling kan imidlertid være nødvendig ved refraktær eller kronisk forstoppelse. Slik forstoppelse kan skyldes legemidler som smertestillende midler (opioider) eller legemidler for behandling av Parkinsons sykdom (antikolinergika). Sykdommer som multipel sklerose eller Parkinsons sykdom kan forårsake refraktær forstoppelse.

Ikke bruk dette produktet i mer enn 30 sammenhengende dager uten å konsultere legen din.

3. Kontraindikasjoner

Skal ikke tas ved intoleranse mot produktet eller kjent overfølsomhet overfor noen av innholdsstoffene eller polyetylenglykol.

Ikke bruk dette produktet til barn under 1 år.

Ikke ta dette produktet hvis du har

- Tarmstenose
- Tarmperforasjon
- Inflammatorisk tarmsykdom (som Crohns sykdom, ulcerøs kolitt)

Skal ikke tas ved tarmobstruksjon.

4. Graviditet og amming

Det finnes ingen tilgjengelige data om bruk av dette produktet under graviditet eller amming. Hvis du er gravid, prøver å bli gravid eller ammer, bør du rådføre deg med lege eller apotek før du tar dette produktet.

5. Mulige bivirkninger

Det anbefales å ikke overskride anbefalt dose, da høyere doser kan forårsake uventede bivirkninger.

Mage-tarmlidelser som borborygmi, magesmerter, kvalme og mild diaré (spesielt i begynnelsen) kan forekomme. Hvis bivirkningene forverres eller ikke forsvinner i løpet av noen dager, eller hvis du merker bivirkninger som ikke er nevnt i denne bruksanvisning, må du kontakte lege.

I sjeldne tilfeller kan overfølsomhetsreaksjoner (utslett og elveblest) forekomme. Hvis du opplever slike bivirkninger, må du slutte å ta produktet og kontakte lege umiddelbart.

6. Interaksjoner med kosttilskudd og legemidler

Dette produktet kan påvirke opptaket av andre legemidler dersom de tas samtidig. Spesielt kan den osmotiske effekten av makrogol og den raskere i tarmpassasjen redusere effekten av legemidlene.

Det er derfor hensiktsmessig at inntaket av legemidlet utsettes med minst 2 timer etter administrering av legemidler som tas via munnen eller andre medisiner eller kosttilskudd. Rådfør deg med lege før du tar dette produktet dersom du tar andre medisiner.

7. Oppbevaring

Oppbevar dette produktet tørt, mellom 15 °C og 25 °C, og beskyttet mot direkte varme eller lyskilder. Åpne dosposen først ved bruk. Ikke bruk dersom dosposene er skadet. Oppbevares utilgjengelig for barn.

8. Advarsler og forholdsregler


For å opprettholde god helse, deriblant en sunn tarm, anbefales det at du følger et riktig kosthold og drikker tilstrekkelig med væske (vanligvis 2,0 til 2,5 liter daglig).

Det anbefales å rådføre lege før bruk til barn.

Simetikon kan påvirke effekten av noen reagenser som brukes til diagnostikk, for eksempel guaiac-gummi.

9. Utløpsdato

Må ikke tas etter utløpsdatoen som er trykt på pakningen. Utløpsdatoen gjelder produktet i intakt emballasje, når det oppbevares riktig.



10. Kassering

Utløpt produkt skal håndteres i henhold til forskriftene for avfallshåndtering i ditt land. Ikke kast søppel, og kast emballasjeavfallet fra dette produktet på en ansvarlig måte.



Dette spørreskjemaet er en del av obligatorisk sikkerhetsovervåking.



Din deltakelse hjelper oss med å sikre produktets kvalitet og sikkerhet.



Vennligst bruk noen minutter på å fylle ut spørreskjemaet på følgende adresse:

<https://siit-pms.com/GC06>

eller ved å skanne denne QR-koden:

Siste revisjon: 10.2025



MoviGo Duo, Norgine og seil-logoen er varemerker som tilhører Norgine-konsernet.



SIIT srl

Via Ariosto 50/60

20090 Trezzano sul Naviglio (MI) ITALIEN



Norgine Danmark A/S, Kirsten Walthers Vej 8A, 2500 Valby, Danmark